


R3年12月1日

初診時



R3年12月1日

初診時



初診時

18～38歳 1日0本
蓄積本数 0本
現在

ポケット 4~6mm

ポケット 7mm以上

- **プロービング時の出血部位
プラークスコア**

9/112部位 (8%)


0/112部位 (0%)

0/112部位 (0%)

20%



う蝕レーダーチャート



歯周病リーダーチャート




R4年12月23日

再評価2



R4年12月23日

再評価2



再評価2

18～38歳 1日0本
蓄積本数 0本
現在

- 

う蝕レーダーチャート

R3年12月1日(初診時)

Total Risk:6

R4年12月23日(再評価2)

Total Risk:6

唾液緩衝能

唾液の量と質

0:10ml以上、1:6ml以上10ml未満
2:3.5ml以上6ml未満、3:3.5ml未満

ミュータンス菌の数

ムシ歯の経験
(DMFT)

ラクトバチラス菌
の数


フッ素の使用状況


0:両方、1:家庭のみ
2:来院時のみ、3:不使用

飲食回数

プラーク蓄積量

0:15%未満、1:15~30%
2:30~50%、3:50%以上






う蝕を避ける可能性
環境
感受性
細菌
食事

う蝕経験	1	(0-3)
関連全身疾患	0	(0-2)
食事内容	3	(0-3)
飲食頻度	0	(0-3)
ブラーク量	1	(0-3)
Mutans streptococci	1	(0-3)
フッ化物 プログラム	0	(0-3)
唾液分泌速度	0	(0-3)
唾液緩衝能	0	(0-2)
臨床的判断	1	(0-3)

再評価2

う蝕を避ける可能性: 75%

初診時
う蝕を避ける可能性: 80%




う蝕を避ける可能性
環境
感受性
細菌
食事

う蝕経験	1	(0-3)
関連全身疾患	0	(0-2)
食事内容	3	(0-3)
飲食頻度	0	(0-3)
ブラーク量	0	(0-3)
Mutans streptococci	2	(0-3)
フッ化物 プログラム	0	(0-3)
唾液分泌速度	0	(0-3)
唾液緩衝能	0	(0-2)
臨床的判断	1	(0-3)

歯周病レーダーチャート

R3年12月1日 77歳(初診時)

R4年12月23日 79歳(再評価2)



歯周組織の変化

- Pd4mm以上の部位の割合
- ブリーディング部位の割合
- プラークスコア

